

# Was unterscheidet durimplant von „üblichen“ CHX-Gelen?

CHX-Gel (0,1-2%)	durimplant Gel
Leicht wasserlösliche Matrix (hydrophil)	nicht wasserlösliche Matrix (hydrophob)
Keine Haftung	sehr gute Haftung
Bleibt nicht am Aufbringort	bleibt lange Zeit am Aufbringort
nicht gut lokal anwendbar(stets ganze Mundhöhle)	sehr gezielt lokal anwendbar (nur am Aufbringort)
Bitterer, unangenehmer Geschmack	Angenehmer Geschmack nach Pfefferminze und Salbei
Wirkt nur durch CHX	kombinierte Wirkung von Salbei, Thymol, Allantoin, CHX
Rein antibakterielle Wirkung	pflegt und kräftigt Zahnfleisch, wirkt antibakteriell und antifungal
Einwirkdauer Minuten	Einwirkdauer über Nacht (slow release)
Sollte max. 1-4 Wochen lang angewendet werden	beliebig lange und oft anwendbar (bei Bedarf ist auch eine bis zu mehrmals tägliche Anwendung möglich) Normalgebrauch nach der Einheilung des Implantats: 1x pro Woche nach dem Zähneputzen
Geschmacksbeeinträchtigung	keine Geschmacksbeeinträchtigung
Nach kurzer Zeit Zahnverfärbungen	keine Zahnverfärbungen
Zahnfleisch kann geschädigt werden	keine Zahnfleischirritationen
Entfernbar durch Abwaschen	nur mechanisch entfernbare (Abwischen)
Arzneimittel	Kosmetisches Mittel (Abgabe im Prophylaxeshop möglich)

Quelle: lege artis, Juli 2010

**durimplant**  
Lang anhaltender Schutz des Zahnimplantats  
durch wirksame Zahnfleischpflege